

Uitwerking Opgaven

Formele talen, grammaticas en automaten

Week 1

Bas Westerbaan
bas@westerbaan.name

26 april 2013

1 Opgave 1.1

Een goed en voldoende antwoord is: “ $L_1 = L_2$, want L_1 en L_2 zijn alle woorden over a en b . $b \notin L_3$, maar $b \in L_1 = L_2$, dus $L_2 \neq L_3$ ”. Een heel gedetailleerd antwoord is:

1.1 L_1

Per definitie $L(a) = \{a\}$ en $L(b) = \{b\}$, dus $L(a \cup b) = L(a) \cup L(b) = \{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$. Verder

$$\begin{aligned} L_1 &= L((a \cup b)^*) \\ &= L(a \cup b)^* \\ &= \{a, b\}^* \\ &= \{a, b\}^0 \cup \{a, b\}^1 \cup \{a, b\}^2 \cup \{a, b\}^3 \cup \dots \\ &= \{\lambda\} \cup \{a, b\} \cup \{aa, ab, ba, bb\} \cup \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\} \cup \dots \\ &= \text{“alle woorden met } a \text{ en } b\text{”}. \end{aligned}$$

1.2 L_2

Per definitie

$$\begin{aligned} L(a^*) &= L(a)^* \\ &= \{a\}^* \\ &= \{a\}^0 \cup \{a\}^1 \cup \{a\}^2 \cup \dots \\ &= \{\lambda\} \cup \{a\} \cup \{aa\} \cup \dots \\ &= \{\lambda, a, aa, \dots\} \\ &= \{a^n; n \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

en vergelijkbaar: $L(b^*) = \{\lambda, b, bb, \dots\}$. Dus

$$\begin{aligned} L(a^*b^*) &= \{vw; v \in L(a^*); w \in L(b^*)\} \\ &= \{\lambda, a, b, ab, aab, bba, aa, bb, aabb, \dots\} \\ &= \{a^n b^m; n, m \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

En dus:

$$\begin{aligned} L_2 &= L((a^*b^*)^*) \\ &= L(a^*b^*)^* \\ &= L(a^*b^*)^0 \cup L(a^*b^*)^1 \cup L(a^*b^*)^2 \cup \dots \\ &= \{\lambda\} \cup \{a^n b^m; n, m \in \mathbb{N}\} \cup \{a^{n_1} b^{m_1} a^{n_2} b^{m_2}; n_1, n_2, m_1, m_2 \in \mathbb{N}\} \cup \dots \end{aligned}$$

Dus L_2 zijn alle woorden over a en b die bestaan uit “nul-of-meer-keer een a en dan nul-of-meer-keer een b en dit alles een eindig aantal keer herhaald”. Maar dit zijn precies alle woorden over a en b .

1.3 L_3

$$\begin{aligned} L(ab^*) &= \{vw; v \in L(a); w \in L(b^*)\} \\ &= \{a, ab, abb, abbb, \dots\} \\ &= \{ab^n; n \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

En dus:

$$\begin{aligned} L_3 &= L((ab^*)^*) \\ &= L(ab^*)^* \\ &= L(ab^*)^0 \cup L(ab^*)^1 \cup L(ab^*)^2 \cup \dots \\ &= \{\lambda\} \cup \{ab^n; n \in \mathbb{N}\} \cup \{ab^{n_1} ab^{n_2}; n_1, n_2 \in \mathbb{N}\} \cup \dots \\ &= \{ab^{n_1} \dots ab^{n_k}; k, n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

Dus L_3 zijn alle woorden van de volgende vorm: “eerst een a en dan nul-of-meer-keer een b ” nul-of-meer-keer.

1.4 Conclusie

Blijkbaar $L_1 = L_2$, maar $L_1 = L_2 \neq L_3$, want bijvoorbeeld $b \in L_1$, maar $b \notin L_3$.

2 Opgave 1.2

2.1 Opgave 1.2 (i)

Een goede oplossing is $(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)$ en dat kun je controleren door de definities uit te schrijven: $L((a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)) = L(a \cup b \cup c)^3 = \{a, b, c\}^3 = \Sigma^3 = \{\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3; \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \in \Sigma\} = \{w; w \in \Sigma^*; \#w = 3\}$.

2.2 Opgave 1.2 (ii)

Een goede oplossing is $(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)^*$, want

$$\begin{aligned}
 & L((a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)^*) \\
 = & L((a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c)(a \cup b \cup c))L((a \cup b \cup c)^*) \\
 = & \Sigma^3 L(a \cup b \cup c)^* \\
 = & \Sigma^3 \Sigma^* \\
 = & \{vw; v \in \Sigma^3, w \in \Sigma^*\} \\
 = & \{w; w \in \Sigma^*; \#w \geq 3\}.
 \end{aligned}$$

2.3 Opgave 1.2 (iii)

Gegeven een woord w , waarin aa precies twee keer voorkomt. Er kunnen twee dingen aan de hand zijn: $w = w_1 a a w_2 a a w_3$ of $w = w_1 a a a w_3$, waarbij aa niet in w_1 , w_2 en w_3 zit en verder: w_1 niet eindigt op een a ; w_3 niet met een a begint én w_2 niet leeg is en noch eindigt noch begint met een a . We maken voor de voorwaarden op w_1 , w_2 en w_3 eerst afzonderlijke reguliere expressies.

aa mag niet in w_1 voorkomen en w_1 mag niet eindigen op een a . We laten w_1 hier allebei aan voldoen, als elke a in w_1 opgevolgd moet worden door minstens één b . $b^*(abb^*)^*$ is dus precies de reguliere expressie waar w_1 aan moet voldoen.

Met een vergelijkbare redenering, kom je erachter dat w_3 moet voldoen aan $(b^*ba)^*b^*$.

De voorwaarden voor w_2 zijn iets ingewikkelder: w_2 mag niet leeg zijn, aa mag er niet in voorkomen en w_2 mag noch eindigen noch beginnen met een a . De reguliere expressie $bb^*(abb^*)^*$ beschrijft precies de voorwaarden op w_2 .

We voegen de deexpressies samen tot

$$b^*(abb^*)^*aabb^*(abb^*)^*aa(b^*ba)^*b^* \cup b^*(abb^*)^*aaa(b^*ba)^*b^*$$

waarvan we nu inzien dat dat een oplossing is.

3 Opgave 1.2

Gegeven zijn $L_1 = \{w \in \{a, b\}^*; bb \text{ komt niet voor in } w\}$ en $L_2 = L(a^*(baa^*)^*b^?)$. De opgave is aan te tonen dat $L_1 = L_2$. Dat betekent dat we moeten laten zien dat $L_1 \subseteq L_2$ en $L_2 \subseteq L_1$.

Verkort “ v komt voor in w ” tot $v \sqsubseteq w$. (Oftewel: $v \sqsubseteq w \iff \exists w_1, w_2 \in \Sigma^* [w = w_1 v w_2]$).

3.1 $L_2 \subseteq L_1$

Als $bb \not\sqsubseteq w$ en $bb \not\sqsubseteq v$, maar $bb \sqsubseteq vw$, dan moet v eindigen met een b en w beginnen met een b . Stel dat $A, B \subseteq \Sigma^*$ en dat voor alle $w \in A \cup B$, $bb \not\sqsubseteq w$ en w eindigt niet met een b , dan geldt dit ook voor alle $w \in AB$. Dit geldt $L(ba)$

en $L(a)$, dus uit het voorgaande volgt dat het ook geldt voor $L(a^*)$, $L(baa^*)$, $L((baa^*)^*)$, $L(a^*(baa^*)^*)$ en $L(a^*(baa^*)^*b?)$. Dus voor elke $w \in L_2$, $bb \not\sqsubseteq w$ en daarmee $w \in L_1$.

3.2 $L_1 \subseteq L_2$

Gegeven $w \in L_1$. Dan komt bb niet voor in w . Dan is w van de vorm $a^{n_0}ba^{n_1}ba^{n_2}b \dots ba^{n_{k-1}}ba^{n_k}$ waar $n_0, n_k \geq 0$ en $n_1, \dots, n_{k-1} \geq 1$. Bijvoorbeeld voor $baaab$ is $k = 2$, $n_0 = 0$, $n_1 = 3$ en $n_2 = 0$ en voor aa is $k = 0$ en $n_0 = 2$. We onderscheiden twee gevallen: w eindigt met een b of niet. Oftewel: $n_k = 0$ of $n_k > 0$.

$n_k = 0$ Allereerst: $a^{n_0} \in L(a^*)$ en $b \in L(b?)$. Verder voor elke $1 \leq i \leq k - 1$, geldt $n_i \geq 1$. Dus $a^{n_i-1} \in L(a^*)$. Dus $ba^{n_i} = baa^{n_i-1} \in L(baa^*)$. Dus $ba^{n_1}ba^{n_2} \dots ba^{n_{k-1}} \in L((baa^*)^*)$. Dus allen tezamen: $w = a^{n_0}ba^{n_1} \dots ba^{n_{k-1}}b \in L(a^*(baa^*)^*b?)$. Dus $w \in L_2$.

$n_k > 0$ Allereerst $a^{n_0} \in L(a^*)$ en $\lambda \in L(b?)$. Verder voor elke $1 \leq i \leq k$ geldt $n_i \geq 1$ dus $ba^{n_1}ba^{n_2} \dots ba^{n_k} \in L((baa^*)^*)$. Beide tezamen: $w = a^{n_0}ba^{n_1} \dots ba^{n_{k-1}}ba^{n_k}\lambda \in L(a^*(baa^*)^*b?)$. Dus $w \in L_2$.

Dus in alle gevallen: $w \in L_2$.

4 Opgave 1.3

Een goede oplossing is

$$\left(b(aa)^*b \cup (a \cup b(aa)^*ab)(bb \cup ba(aa)^*ab)^*(a \cup ba(aa)^*b) \right)^*$$

De methode om tot deze oplossing te komen, wordt behandeld in het derde hoorcollege.